

WAT?

- NSAID = Niet Steroïdaal Anti-Inflammatoir Geneesmiddel met pijnstillend, koortswerend en ontstekingsremmend effect
Formularium: **Naproxene EG[®], Ibuprofen EG[®], Gambaran[®]** → oraal
Voltaren[®] → parenteraal
- Paracetamol (dafalgan) = eerste keuze analgeticum
Gebruik NSAID enkel als er geen alternatief is, Combineer nooit 2 NSAID
- Gebruik NSAID zo kort mogelijk (< 1 week) in de laagst mogelijke dosering

ERNSTIGE RISICO'S

CONTRA-INDICATIES voor ALLE nsaid

1. Actief gastroduodenaal ulcus

- Hoger risico op ulceraties, bloedingen, perforaties bij oudere patiënten (>65j), voorgeschiedenis van ulcera, H. Pylori infectie, medicatie
- Vermijd gelijktijdig gebruik met:

Anti-aggregantia	Acetylsalicylzuur, Ticlid [®] , Aggrenox [®] , Persantine [®] , Plavix [®] , Efixent [®] , Brilique [®]
(Nieuwe) anti-coagulantia	Sintrom [®] , Marcoumar [®] , Marevan [®] , Pradaxa [®] , Xarelto [®] , Eliquis [®]
Overige	Corticosteroiden (Medrol [®]) Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitoren (Prozac [®] , Seroxat [®] , Sipralaxa [®] ...)

- Overweeg maagprotectieve middelen (protonpompinhibitoren, H2-antihistaminica) bij risicopatiënten.

2. Ernstige nierinsufficiëntie

GFR < 30 ml/minuut: absolute contra-indicatie
GFR < 60 ml/minuut: relatieve contra-indicatie

- Het risico op ernstige nierinsufficiëntie is vooral hoog bij combinaties met o.a. diuretica en ace-inhibitoren / sartanen / renine-inhibitoren, aminoglycosiden, radiocontraststoffen.
- Volg het serumcreatinine op na 3 en 7 dagen na het starten van het NSAID.

- Antecedenten van astma** (verhoogd risico op astma-exacerbatie) **of urticaria** tgv inname van acetylsalicylzuur of een NSAID
- Leverinsufficiëntie**
- Ernstig hartfalen**

Specifieke CONTRA-INDICATIES voor aceclofenac, diclofenac, coxibs

- Coronairlijden, antecedenten van CVA, perifeer vaatlijden en matig tot ernstig hartfalen
→ Extra voorzorg: patiënten met cardiovasculaire risicofactoren (hypertensie, diabetes mellitus, hyperlipidemie, roken) mogen slechts na zorgvuldige evaluatie worden behandeld.

Ernstige INTERACTIES, te vermijden

- Nsaid - methotrexaat in hoge dosis (> 20 mg/week): toxiciteit methotrexaat stijgt
- Nsaid - lithium: toxiciteit lithium (Camcolit[®], Maniprex[®]) stijgt
- Nsaid - alle antihypertensiva: daling van het antihypertensief effect

Nog vragen?

MFC - Klinische farmacie: helpdesk klinische farmacie, t. 6195 (ma-di-do)